

# Detección del consumo de sedantes

## BOLETÍN DE NOTICIAS

Julio de 2022



### Test de drogas en conductores accidentados: el THC y la benzodiacepinas en 1.ª y 2.ª posición

La conducción después del consumo de benzodiacepinas (BZO) multiplica por cinco el riesgo de resultar herido en un accidente de tráfico<sup>1</sup>. Si, además, se acompañan de alcohol, el riesgo se dispara a 112 veces mayor. Las benzodiacepinas pertenecen a la categoría de sedantes, al igual que el cannabis y los opiáceos/opioides. Las consecuencias de su consumo suelen pasar más inadvertidas que las relacionadas con el consumo de estimulantes, pero son igualmente peligrosas.


La relajación, a menudo acompañada de euforia, el paso del tiempo muy lentamente, reacciones y movimientos retardados, un sentimiento de ligereza – estos son los estados que se generan tras el consumo de sedantes. Los consumidores se sienten como “envueltos en algodón”. Las consecuencias son una percepción errónea del entorno y de la situación del tráfico: no se reconocen los semáforos

#### ¿Qué son los sedantes?

En la categoría de sedantes o sustancias distribuidas como “tranquilizantes”, se encuentran los opiáceos/opioides y las benzodiacepinas así como el cannabis. Estas sustancias tienen principalmente un efecto calmante y relajante. De forma simultánea, pueden causar emociones impulsivas y eufóricas. En el ámbito médico, las benzodiacepinas y los opiáceos/opioides se utilizan, por ejemplo, como ansiolíticos, en casos de estrés o para aliviar el dolor. Pueden adquirirse de forma legal únicamente con receta y presentan un elevado potencial de adicción. Asimismo, se están introduciendo con fuerza en la escena de las drogas ilegales<sup>2</sup>.

en rojo, se pasan por alto los peatones, no se evalúa correctamente la velocidad de circulación y se olvidan

Desde 2007, el número de benzodiacepinas notificado por primera vez al Sistema de alerta Temprana de la Unión europea crece sin freno.



Fuente: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA), Lisboa

## Signos evidentes de un consumo indebido de sedantes

Estos son algunos de los principales signos distintivos que aparecen cuando se han consumido sedantes.

Sin embargo, estos puntos no lo engloban todo y existen otros factores. Para la detección segura de estos signos, se recomienda la participación en cursos de formación teórica y práctica, como los que ofrece, por ejemplo, Securetec.

### Síntomas físicos:

- Párpados caídos, mirada "somnolienta"
- Pupilas contraídas
- Pupilas fijas y con reacción lenta a la luz
- Salivación incontrolada
- Trastornos motores generales
- Frecuencia cardíaca/respiratoria alterada
- Sudoración

- Puntos de inyección

- Náuseas, vómitos

### Trastornos de conducta:

- Indiferencia
- Aturdimiento, somnolencia
- Caminar de forma inestable
- Desconexión de la realidad
- Euforia

las distancias de frenado o los procesos de trabajo. Los consumidores asumen mayores riesgos, ya que el estado de relajación les sugiere la inexistencia de peligro. Es indiferente si la sustancia se ha ingerido como medicamento o como ayuda ilegal para el día a día. Muchos pacientes no se paran a pensar si están en condiciones para conducir o si han sucumbido a su elevado potencial adictivo. El peligro para ellos mismos y su entorno es el mismo.

El número de conductores que se ponen al volante, a pesar de haber consumido sedantes, va en aumento. Hasta ahora, el cannabis es la droga más consumida entre los conductores controlados, aunque seguida de cerca por las benzodiazepinas legales e ilegales. El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA, por sus siglas en inglés) ha registrado una disponibilidad creciente y un

consumo en aumento tanto para este grupo de drogas como para los opiáceos/opioides. Para abastecer el mercado ilegal, algunas de estas sustancias se desvían de aplicaciones médicas y otras provienen del entorno de las denominadas drogas de diseño. En algunos países europeos y en EE. UU., se ha constatado un número mayor de muertes por sedantes.

La mayoría de los consumidores de drogas piensan que no los descubrirán mientras conducen o en su puesto de trabajo. Y hasta el 80 % de las personas que toman medicamentos subestiman los elevados riesgos de los sedantes en su vida diaria. Los controles sistemáticos son un medio sostenible para conseguir que el tráfico y el lugar de trabajo sean más seguros, así como para crear conciencia sobre los peligros.



**Los tests de saliva DrugWipe® 6 S también detectan de forma rápida y segura sedantes como, por ejemplo, las benzodiazepinas. Contacte con nosotros para cualquier consulta.**

Fuentes: <sup>1</sup> Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (Federación contra el alcohol y las drogas en el tráfico rodado), www.bads.de, Hamburgo — <sup>2</sup> Informe Europeo sobre Drogas de 2022 y New Benzodiazepines in Europe (Nuevas benzodiazepinas en Europa), 2021, Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA), Lisboa — Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (Centro Alemán de Problemas de Adicción), Hamm, www.dhs.de — Bundesanstalt für Straßenwesen (Instituto Federal de Investigación de Carreteras), www.bast.de, Bergisch Gladbach

### Securetec Detektions-Systeme AG

Lilienthalstraße 7

85579 Neubiberg

Alemania

Tel. +49 89 203080-1651; Fax +49 89 203080-1652

info@securetec.net • www.securetec.net

© 2022 Securetec Detektions-Systeme AG

70569-ES-v01-2022-07-21

Fuentes de las imágenes: Securetec AG; AdobeStock 254163681

Test de saliva DrugWipe  
en YouTube:



DrugWipeGlobal@twitter

we detect to protect