

Nuevo test de saliva para buprenorfina y metadona

BOLETÍN DE NOTICIAS

Junio de 2019

DrugWipe® 2 S BUP/MTD

Terapia contra la adicción y uso abusivo: el doble filo de la buprenorfina y la metadona

Los ingredientes activos buprenorfina y metadona se han utilizado con éxito durante años en las terapias para drogodependientes. Sin embargo, ambas sustancias al mismo tiempo también se utilizan indebidamente como drogas. Por este motivo, Securetec ha desarrollado el test de saliva DrugWipe 2 S para buprenorfina y metadona.

El uso oral de metadona y el uso sublingual de buprenorfina satisfacen el deseo físico de opiáceos y, por lo tanto, previenen los síntomas de abstinencia. Sin embargo, no se materializa la euforia deseada. Para conseguir ese efecto de "subidón", debe aumentarse la dosis o cambiarse la forma de administración. Esto es así porque la aplicación intravenosa o nasal logra niveles sanguíneos más altos más rápidamente que la ingesta terapéutica prescrita.



DrugWipe® 2 S BUP/MTD

Número de artículo: S 207 G



Datos de interés:

¿Cuáles son las características del test rápido?

- Resultado del test rápido: evaluación en 3 minutos (8 como máximo)
- Higiénico: toma de muestras rápida y sencilla
- Flexible: realización en cualquier momento y lugar
- Fiable: obtención de resultados incluso con sequedad bucal; protegido contra manipulaciones



	Metadona	Buprenorfina
Dosis típica en la terapia de sustitución	80-120 mg/día	4-24 mg/día
Tipo de dosificación	Gotas o comprimidos	Principalmente sublingual (p. ej., Subutex®)
Efecto	Calmante, ansiolítico y sedante como la morfina, pero sin "subidón"	Efecto débil en comparación con las morfinas y no sedante
Duración del efecto	3-4 h	Hasta 72 h
Riesgos	Riesgo de muerte en caso de sobredosis por parada respiratoria	Menor riesgo de paro respiratorio en caso de sobredosis
Aceptación/prospectivas de éxito de la terapia	Mayor aceptación que la buprenorfina en pacientes con un largo historial de adicción	Un efecto sedante inferior tiene ventajas para los pacientes jóvenes o integrados socialmente/profesionalmente

Comparación de las propiedades de la buprenorfina y la metadona

El consumo se ve favorecido por la buena disponibilidad de ambas sustancias en el mercado negro. En 2016 se incautaron 22 kg de metadona y 2 kg de buprenorfina ilegales en Europa¹. Los agentes de aduanas de Hamburgo informaron recientemente de una incautación espectacular: se incautaron comprimidos de Subutex® por valor de 1 millón de euros. Los comprimidos se dirigían de Francia a Escandinavia. A diferencia de Alemania y los países escandinavos, el Subutex® no está incluido en el ámbito de aplicación de la ley de estupefacientes francesa. Se puede obtener fácilmente en una farmacia y cuesta entre 1 y 2 euros por comprimido. Alemania y Escandinavia son mercados de venta atractivos, pues los precios en el mercado negro son en algunos casos de más de 30 euros por comprimido.

DrugWipe 2 S, un test realmente sorprendente

¹ Informe Europeo sobre Drogas 2018

Securetec Detektions-Systeme AG

Lilienthalstraße 7
85579 Neubiberg
Alemania
Tel. +49 89 203080-1651
Fax +49 89 203080-1652
info@securetec.net
www.securetec.net

© 2019 Securetec Detektions-Systeme AG
70547-ES-v01-2019-05-31

Fuente de la imagen: Adobe Stock Tino Neitz,
Gerresheimer AG



DrugWipeGlobal@twitter